



Husk at følge Cossack-Vejret på Bayers hjemmeside [www.cropsscience.bayer.dk](http://www.cropsscience.bayer.dk)

## UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORNAFGRØDER EFTERÅR OG FORÅR

Vinterhvede og triticale	Strategi		Kun forårsbehandling	Kommentarer
	Efterårsbehandling	Opfølgning forår		
<b>Enårig rapgræs, vindaks og bredbladet ukrudt</b>	Mateno Duo 0,35-0,5 l/ha + prosulfocarb 0,5 l/ha	Cossack OD 0,5-0,8 l/ha	Cossack OD 0,5-0,93 l/ha + DFF	Cossack OD kan blandes med 0,5 l/ha CCC i vinterhvede. DFF tilsættes ved agerstedmoder, ærenpris og tvetand ved forårsbehandling.
<b>+ Rajgræs</b>	Mateno Duo 0,5-0,7 l/ha + prosulfocarb 1,0 l/ha	Cossack OD 0,75 l/ha	Cossack OD 0,75-0,93 l/ha	Kør ved vækststart.
<b>+ Hejre</b>	Mateno Duo 0,35 l/ha + prosulfocarb 0,5 l/ha	Cossack OD 0,75 l/ha	Cossack OD 0,75-0,93 l/ha	Cossack OD: Tilsætning af 10 kg N i flydende gødning øger effekten – kun i vinterhvede. Kør ved vækststart og følg evt. op med andre græsmidler – eventuelt kun randbehandling.
<b>+ Rævehale</b>	Mateno Duo 0,7 l/ha + prosulfocarb 1,0 l/ha	Cossack OD 0,93 l/ha eller Atlantis OD 0,9 l/ha	Cossack OD 0,93 l/ha eller Atlantis OD 0,9 l/ha	Cossack OD/Atlantis OD: Tilsætning af 10 kg N i flydende gødning øger effekten – kun i vinterhvede. Kør ved vækststart.
<b>+ Væselhale</b>	Mateno Duo 0,7 l/ha + prosulfocarb 1,0 l/ha	Cossack OD 0,93 l/ha eller Atlantis OD 0,9 l/ha		Cossack OD/Atlantis OD: Tilsætning af 10 kg N i flydende gødning øger effekten – kun i vinterhvede. Kør ved vækststart.
<b>Vinterrug</b>	<b>Efterårsbehandling</b>	<b>Opfølgning forår</b>	<b>Kun forårsbehandling</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Græs- og bredbladet ukrudt</b>	Mateno Duo 0,35 l/ha Opfølgning 8-10 dage senere med prosulfocarb 1,0 l/ha	Cossack OD 0,5-0,6 l/ha eller Hussar Plus OD 0,1 l/ha eller Atlantis OD 0,45 l/ha	Cossack OD 0,6 l/ha eller Hussar Plus OD 0,14 l/ha eller Atlantis OD 0,45 l/ha + DFF	Kør ved vækststart. Ved enårig rapgræs anvendes Cossack OD/Atlantis OD. Max. 0,6 l/ha Cossack OD (senest st. 32) og max. 0,45 l/ha Atlantis OD (senest st. 30). Hussar Plus OD (senest st. 32) DFF tilsættes ved agerstedmoder, ærenpris og tvetand ved forårsbehandling.
<b>Vinterbyg</b>	<b>Efterårsbehandling</b>	<b>Opfølgning forår</b>	<b>Kun forårsbehandling</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Græs- og bredbladet ukrudt</b>	Mateno Duo 0,35 l/ha Opfølgning 8-10 dage senere med prosulfocarb 1,0 l/ha	Hussar Plus OD 0,05 l/ha	Hussar Plus OD 0,05 l/ha	Tidlig behandling ved vækststart er påkrævet for maksimal effekt. Hussar Plus OD senest anvendelse st. 32
<b>Vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale</b>	<b>Efterårsbehandling</b>	<b>Opfølgning forår</b>	<b>Kun forårsbehandling</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Moderat ukrudtstryk af tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs og rajgræs</b>	Mateno Duo + prosulfocarb	Hussar Plus OD 0,05-0,07 l/ha + Pixxaro 0,15 l/ha		Vinterbyg: max 0,05 l/ha Hussar Plus OD Forårsopfølgning mod lavt ukrudtstryk af rajgræs, enårig rapgræs, fuglegræs, kamiller, buresnerre, storkenæb. Dosis af Pixxaro øges ved resistent fuglegræs. Kan kombineres med svampe- og vækstreguleringsmidler til og med st. 32. Pixxaro kan evt. erstattes af 0,3 l/ha Zypar
			<b>Kun forårsbehandling</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Enårig rapgræs, rajgræs og bredbladet ukrudt</b>	–	–	Hussar Plus OD 0,07 l/ha + DFF 0,03-0,05 l/ha + Pixxaro 0,2 l/ha  Primera Super 0,8-1,0 l/ha	Der bør behandles i kornets st. 13-21, dog afventes evt. fremspring af græsukrudt. Ved tilsætning af mangan til Hussar Plus OD erstattes olie med sprede-klæbemiddel. DFF tilsættes ved agerstedmoder, ærenpris og tvetand. Pixxaro tilsættes ved storkenæb, hejrenæb, jordrøg og resistent fuglegræs.  Ved problem med flyvehavre, hanespore, alm. rapgræs, agerrævehale behandles senest st. 30.