

Foråret starter med Cossack

– Følg **Cossack Vejret** og tilpas dosis efter ukrudtets størrelse



COSSACK



COSSACK[®]
VEJRET

0,93 l/ha Cossack
Stort græsukrudt



0,7 l/ha Cossack
Mellem græsukrudt



0,5 l/ha Cossack
Småt græsukrudt



Tjek dit lokale Cossack Vejr på www.cropscience.bayer.dk



Foråret starter med Cossack

– Følg Cossack Vejret og tilpas dosis efter ukrudtets størrelse



COSSACK

Cossack OD – den komplette ukrudtsløsning i foråret i vinterhvede, rug og triticale

- // Høj effekt på rajgræs, agerrævehale, rapgræs, vindaks og tokimbladet ukrudt
- // God effekt på væselhale og flyvehavre
- // Kør så tidligt som muligt i foråret, når der er vækst i ukrudtet – tjek Cossack Vejret for optimal timing
- // Bedst effekt opnås på små ukrudtsplanter i god vækst

AFGRØDER	DOSERING	BEMÆRKNING
Vinterhvede og triticale	0,5-0,73 l/ha (st. 13-22) 0,5-0,93 l/ha (st. 23-32)	Tilsætning af 5-10 kg N i flydende gødning kan øge effekten mod agerrævehale, væselhale og rajgræs – kun i vinterhvede
Rug	0,5-0,6 l/ha (senest st. 32)	I rug må max. anvendes 0,6 l/ha

Tilsæt 0,5 l/ha olie til Cossack. I vinterhvede kan blandes med max. 0,5 l/ha CCC.

Husk at behandle på tørre planter og sørg for en god dækningsgrad på ukrudtet.

Tilsæt evt. DFF ved agerstedmoder og ærenpris. Tilsæt Pixxaro eller Zypar ved storkenæb eller resistent fuglegræs.

Effektskema	Ukrudt 3-4 blade			Ukrudt >6 blade		
	0,5 l/ha	0,7 l/ha	0,93 l/ha	0,7 l/ha	0,93 l/ha	
Vindaks	■	■	■	■	■	
Rajgræs, alm	■	■	■	■	■	
Rajgræs, italiensk	■	■	■	■	■	
Rapgræs, alm	■	■	■	■	■	
Rapgræs, enårig	■	■	■	■	■	
Hanespore	■	■	■	■	■	
Agerrævehale	■	■	■	■	■	
Flyvehavre	■	■	■	■	■	
Væselhale (bedst effekt opnås om efteråret med Mateno Duo)	■	■	■	■	■	
Goldhejre (opfølgning senere med andet græsmiddel)	■	■	■	■	■	
Forglemmigej, mark	■	■	■	■	■	
Fuglegræs	■	■	■	■	■	
Hanekro	■	■	■	■	■	
Kamille, lugtløs	■	■	■	■	■	
Raps	■	■	■	■	■	
Burresnerre	■	■	■	■	■	
Valmue, korn	■	■	■	■	■	
Pileurt, fersken	■	■	■	■	■	
Tvetand	■	■	■	■	■	
Ærenpris, storkronet	■	■	■	■	■	95-100 %
Ærenpris, mark	■	■	■	■	■	85-94 %
Pileurt, snerle	■	■	■	■	■	70-84 %
Stedmoder, ager	■	■	■	■	■	50-69 %
Storkenæb	■	■	■	■	■	<49 %

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Kilde: PVO

Pixxaro®, Zypar® Corteva

Hør mere hos din konsulent eller læs mere på
www.cropscience.bayer.dk



Christian Søndergaard
Christensen
2894 3024



Jens-Richardt
Thyssen
2810 4611



Klaus
Nielsen
2894 2068

